Rapport de Cinq observations envoyées a L'academie par Mr. Fleuret Mtre en Chirurgie.

La premiere a pour objet des hydatides formées dans les reins d'une fille et Expulsées par l'urethre.

La Demoiselle Quentin ressentit à 15 ans de legeres douleurs nephrétiques du côté gauche; elles commencoint à la region lombaire, parcouroient successivement tous les points de l'urethre et se bornoient à la vessie; ces douleurs ne cessoient qu'apres que la malade avoit rendu par l'urethre des portions d'hydatides ou des hydatides entieres dont les plus grosses egaloient un oeuf de Pigeon. Les accidens reparurent plusieurs fois, et toujours avec plus de force. a 33 ans elle cessa d'etre reglée, sans que sa santé en parut alterée, à 38 ans et demi, suivant les termes de Mr. fleuret sa tete parut un peu derangée; et à 39 elle mourut. le rein gauche etoit transformé en une poche membraneuse dont la superficie étoit recouverte de tubercules et qui contenoit un grand nombre d'hydatides plus petites que celles qui avoit été rendues en differens tems, il en paroissoit aussi des germes le long de l'uretere du meme coté; ces hydatides etoient remplies d'urines bourbeuses, leurs parois formées de deux membranes unies par du tissu cellulaire. Mr. fleuret conserve cette piece dans l'eau de vie et l'offre à l'academie.

Les hydatides des reins ne sont pas des maladies rares, on en voit un grand nombre d'exemples dans fabrice de Hildan, Ruich; Merclinus, Horstius; dans les ouvrages de Morgagni et de Mr. Dehahen, et dans les memoires des

Differentes

ARC
Carton 134
n° 31

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Differentes academies, jen ai meme trouve dans plusieurs cadavres toutes etoient adhaerentes à la substance du rein, aulieu que celles en question etoient libres, ont passé par l'ureterre dans la vessie qui les a expulsées par l'urettre; cette observatin est dautant plus interessante quelle est unique dans son Espece, quelle en procurera peut etre d'autres, en reveillant l'attention des observateurs et quon en peut faire usage pour reconnoître la meme maladie dans d'autres sujets. et meme pour en établir la cure sur tout quand ces hydatides obstruent l'urettre. il serait meme a propos que l'academie accepta la piece que mr. fleuret lui offre pour etre conserve dans sa collection de pieces Pathologiques.

La deuxieme observation a pour objet une double poche membraneuse trouvée dans une fouine en place du rein gauche et de ses vaisseaux Emulgents. La plus exterieure quatre fois plus grande que le rein droit etoit environnée de graisse et remplie d'une eau dans laquelle nageoit la seconde, de la forme d'un vers, d'un pieds et demi de longt et de huit lignes de Diametre, remplie d'une humeur sanguinolente, et formée de fibres longi-tudinales et circulaires.

L'objet de la troisième observation est une semblable poche trouvée aulieu du rein gauche d'un chien dont les vaisseaux Emulgens existoient encore.

Les poches membraneuses de ces deux observations augmentent le nombre des Exemples d'hydatides flottantes dans les reins, et sous ce point de vué elles pourront etre utiles a l'academie.

La quatrieme observation a pour objet une hernie inguinale avec gangrene et ouverture a l'intestin guerie radicalement.

Un homme de 22 ans Exerçant le metier de megissier portoit depuis son enfance une hernie inguinale a laquelle

il survint etranglement. Les saignées, les Emolliens, les lavemens et les purgatifs employés pendant 17 jours calmerent un peu les accidents, sans quon put obtenir la reduction mr. fleuret fit à tems loperation; le sac herniaire étoit sain et fut ouvert avec precaution on y trouva point dintestin, il en sortit seulement une grande quantité de matière fluide, puante avec une portion dintestin detachée par la gangrene; mr. fleuret en portant le doigt audela du ligament de fallope+ ny sentit point ~~d'a~~ d'adhaereme dintestin, et ne put reconnoitre l'etendue de la gangrene. il pensa la playe avec methode, le malade fut mis a un regime convenable à son Etat, et tous les accidens cesserent. le 20 jour ayant mangé de la chiotré ils se renouvellerent ~~et~~ et furent Combattus par les moyens Enoncées cy dessus. Les matieres fecales coulerent par la playe jusquau 64. jour de L'operation. le malade Commença ensuite a en rendre par L'anus. Enfin au bout de 4 mois il a été parfaitement gueri. Mr. fleuret ne dit point dans son observation si le sac herniaire etoit Commun au testicule, cequi preceda l'etranglement &c. il paroit d'ailleurs s'etre comporté dans le traitement de cette maladie en Chirurgien instruit, son observation merite d'etre Conservée; et il est a propos quon le prie de faire part à L'academie des suites de cette ~~cette~~ cure pour en deduire des consequences utiles à la pratique.

+ lauteur a sans doute voulu Dire audela de l'anneau,

La 5me. observation a pour objet lextirpation d'un bouton Chancreux a levre inferieure d'un homme agé de 53 ans. Mr. fleuret rapportoiau

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

les bords de la playe et les maintient reunis avec deux languettes de taffetas dangleterre qui s'étendoient des angles de la machoire inferieure jusqu'à 3 lignes des bords de la playe ou elles furent fixés par des fils; il appliqua ensuite le bandage de Mr. Louis. et le malade a été guéri aubout de 12 jours.

Cette observation confirme les precepts etablis par l'academie sur le Bec de lievre —

Du Sault